

TASK®

Wirkstoffe:

Rimsulfuron 32,5 g/kg + Dicamba 609 g/kg

Gebinde:

Pack 1: 4 x 307 g TASK®
+ 1l FHS= 4–5 ha

Pack 2: 4 x 600 g TASK®
+ 2 x 1l FHS= 8–10 ha

ANWENDUNGSVORTEILE

- Keine Gewässer- und Hangaufgaben
- Jährlicher Einsatz möglich (Nicosulfuron-frei)
- Breit wirksam gegen Unkräuter und Ungräser
- Erfasst aufgelaufene Winde, Distel und Ampfer
- Sehr kulturverträglich

**Erfasst auch aufgelaufene Winde,
Distel und Ampfer!**

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Standardempfehlung:

Gegen breite Mischverunkrautung inkl. Ampfer, Distel, Winde und Ungräser inkl. Ackerfuchsschwanz, Quecke, Weidelgräser, Grünroggen, Hirsen

**TASK® 300 g/ha + 0,25 l/ha FHS
+ Bodenherbizid
z. B. Gardo® Gold/Successor®T
2,5–3,0 l/ha**

Einsatzbereich (BBCH)



11



12



13



14



16

Standortspezifische Aufwandmengenanpassung ist möglich z. B.:

- Gegen kleine Hirse und Unkräuter: 240 g/ha TASK® + 0,2 l/ha FHS + Bodenherbizid
- Spätanwendung gegen größere Ungräser: 380 g/ha TASK® + 0,3 l/ha FHS + Bodenherbizid

TASK® lässt sich hervorragend kombinieren – so empfehlen wir die Standardempfehlung TASK® + Bodenherbizid bei folgenden Bedingungen zu ergänzen:

Ergänzungspartner bei

- Triazinresistentem Nachtschatten
+ Teilmenge Callisto®
- Altverunkrautung
+ Teilmenge Callisto®




Nachtschatten



Altverunkrautung

UNSERE EMPFEHLUNG AN GEWÄSSERN MIT HANGLAGE / TBA-FREI



* Länderspezifischer Mindestabstand ist zu beachten!

** Bei extremer Altverunkrautung Zugabe einer Teilmenge Callisto®

WIRKUNGSSPEKTRUM

UNGRAS / UNKRAUT	TASK® + BODENHERBIZID
Ackerstiefmütterchen	●●●●
Amarant	●●●●
Ausfallraps + Sonnenblume	●●●●
Dreigeteilter Zweizahn	●●●●
Ehrenpreis	●●●●
Franzosenkraut	●●●●
Gemeines Kreuzkraut	●●●●
Ackerhohlzahn	●●●●
Taubnessel	●●●●
Hundspetersilie	●●●●
Kamille	●●●●
Klettenlabkraut	●●●●
Knöterich-Arten	●●●●
Melde- / Gänsefußarten	●●●●

UNGRAS / UNKRAUT	TASK® + BODENHERBIZID
Schwarzer Nachtschatten***	●●●●
Vogelmiere	●●●●
Ackerfuchsschwanz	●●●●
Rispengräser/Windhalm	●●●●
Hühnerhirse	●●●●
Blut- und Borstenhirse	●●●●
Ampfer****	●●●●
Distel****	●●●●
Winde****	●●●●
Mohrenhirse/ Gabelblütige Hirse	●●●●
Ausfallgetreide, Weidelgras	●●●●
Grünroggen	●●●●
Flughäfer	●●●●
Quecke****	●●●●

●●●● sehr gute Wirkung ●●●● mittlere Wirkung
●●●● gute Wirkung ●●●● geringe Wirkung

*** bei Triazinresistenz Minderwirkung möglich!

**** wenn Pflanzen aufgelaufen sind